

Unser Angebot

Das Team des Adipositas-Zentrums berät Sie umfassend zu den Therapiemöglichkeiten bei Adipositas.

Die Expertinnen und Experten aus den Bereichen Anästhesie, Pflege, Ernährungsberatung, Psychologie und plastische Chirurgie stehen Ihnen sowohl in der Vorbereitungsphase als auch in der Nachbehandlung zur Verfügung.

Dabei steht die persönliche Betreuung im Vordergrund: Gemeinsam wählen wir mit Ihnen das für Sie beste OP-Verfahren aus.

Alle Voruntersuchungen können ambulant durchgeführt werden. Im Göttlicher Heiland Krankenhaus werden alle gängigen OP-Methoden minimalinvasiv angeboten, auch nach bereits erfolgten bariatrischen Eingriffen.

Wir sind bestrebt, dass unsere Patientinnen und Patienten umfassend informiert sind, deshalb veranstalten wir monatlich eine Adipositas-Informationsveranstaltung. Ihre Teilnahme daran ist Voraussetzung für die Operation.

Adipositasambulanz

Telefonische Anmeldung Mo-Fr 13-15 Uhr erforderlich

T: +43 1 40088-7700

Kontakt



OÄ Dr. in Brigitt Obermayer, MBA

Leiterin Adipositas-Zentrum
brigitt.obermayer@khgh.at



Clara Sixt

T: +43 1 40088-7714
adipositas@khgh.at

Krankenhaus Göttlicher Heiland GmbH Dornbacher Straße 20–30 · 1170 Wien
T: +43 1 40088-7700 · adipositas@khgh.at · www.khgh.at




Adipositas-Zentrum

Unsere Expertinnen und Experten beraten und begleiten Sie umfassend.



Gesundheit
kommt von Herzen.

Operationsmethoden im Vergleich



	Magenband	Sleeveresection	Magenbypass	Omega-Loop-Bypass
Wie hoch ist der durchschnittliche Gewichtsverlust?	40-55%	60-70%	60-75%	60-75%
Wie lange ist der Krankenhausaufenthalt nach der OP?	2-3 Tage	3-4 Tage	5-7 Tage	3-5 Tage
Wie viele Patienten nehmen nicht zufriedenstellend ab (weniger als 25% des Übergewichts)?	> 30%	5%	1-2%	1-2%
Wie stark ist die Umstellung der Ernährungsgewohnheiten?	stark	stark	sehr stark	sehr stark
Wie rasch nimmt man ab?	mittel	schnell	sehr schnell	sehr schnell
Wann erreicht man sein Zielgewicht?	nach 9-18 Monaten			
Wie verträglich ist die Methode mit meinem Kinderwunsch bzw. Schwangerschaft?	In den ersten 18 Monaten sollte eine Schwangerschaft vermieden werden (bis eine Gewichtsstabilisierung eingetreten ist und sich der Körper nicht mehr in einem Energiedefizit befindet). Nach 18 Monaten ist eine Schwangerschaft problemlos möglich, wichtig sind Kontrolle und Vitaminersatz.			
Ist die Methode bei Diabetes Typ 2 geeignet?	bedingt	bedingt	ja	ja
Welche möglichen Komplikationen können auftreten?	Durchwanderung Slipping Portkomplikationen	Ausweitung des Magenschlauchs Sodbrennen	Enge des Mageneingangs Mangelerscheinungen	Enge des Mageneingangs Mangelerscheinungen
Wie groß ist die Hilfe der OP-Methode beim Abnehmen?	mittel	groß	sehr groß	sehr groß
Wie oft sind Nachbetreuung und Kontrollen notwendig?	nach 3, 6 und 12 Monaten, danach 1-mal jährlich			